

紀北家畜保健衛生所

電話 073-462-0500

紀南家畜保健衛生所

電話 0739-47-0974

紀南家畜保健衛生所 東牟婁支所

電話 0735-58-1481

渡り鳥のシーズンです！

高病原性鳥インフルエンザへの警戒を！

渡り鳥のシーズンがやって来ました。渡り鳥は鳥インフルエンザのウイルスを各地へ運びます。平成30年1月に香川県のブロイラー農家で発生した高病原性鳥インフルエンザのウイルスは欧州のウイルスとユーラシアのウイルスから生まれ、渡り鳥によって日本国内に運ばれたと考えられています。近年、アジア諸国では季節を問わず高病原性及び低病原性鳥インフルエンザが確認されており、渡り鳥によるウイルスの日本国内への侵入が懸念されています。養鶏農家の方は冬季を迎えるにあたり、ウイルスの農場侵入を防ぐために今一度予防対策の重要ポイントを守りましょう。

飼養衛生管理基準の遵守の徹底！

- 衛生管理区域及び家きん舎への出入りの際の洗浄・消毒の徹底
- 衛生管理区域専用の衣服、靴、家きん舎ごとの専用の靴の使用
- 家きん舎周囲の清掃、整理・整頓、農場に入る車両の徹底した消毒を行い、ウイルスの侵入・拡散を防ぎましょう。

野生動物の侵入防止対策！

スズメやイタチなどの野生動物はわずか数センチの隙間があれば家きん舎内に侵入が可能です。

- 家きん舎の屋根や壁面に破損がある場合には、すぐに修繕する
- 扉の隙間、集卵用バーコンベアや除糞ベルトの出入り口、家きん舎脇の排水口の隙間を金網やウレタン等で埋める
- 野鳥の止まり木となる家きん舎近くの木を伐採する、防鳥ネットを設置する

これらの対策を行い、野生動物の侵入経路を防ぎましょう。

【参考】 予防対策の重要ポイント

<http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/tori/attach/pdf/index-62.pdf>

高病原性鳥インフルエンザの早期発見のために！

毎日、家きんの健康観察を行い

- 急激な死亡羽数の増加
(過去21日間の平均死亡羽数の2倍以上の死亡)
- 5羽以上の鶏がまとまって死んでいる

その他、異常を認めた場合はすぐに最寄りの家畜保健衛生所に通報してください。

気になることや不明な点がありましたら、最寄りの家畜保健衛生所までお問い合わせください。